

Grandes
Cultures

vertissements[®] agricoles uvergne

Bulletin technique N° 5 du 04/05/95

BLE
Septoriose : Traitement en Sologne et Bocage.

ORGE D'HIVER
Maladies : Vigilance à l'épiaison.

BETTERAVES
Pucerons : A surveiller.

BLE

(Début sortie : F1 - 8.
Stades)
(Début gonflement - 9.

MALADIES

★ Situation

Depuis notre dernier bulletin du 27/4, la Septoriose est encore en légère progression, notamment dans l'Allier (Sologne et Bocage) avec un début de passage sur les F3.

INFO PRESEPT

Allier (semis précoces) : ATTENTION, progression importante du risque dès la fin de la semaine dernière.
Ce niveau du risque déclenche un traitement urgent (1ère décade de mai) en Sologne (Poste météo de St-Pourçain-/Besbre) et Bocage (Poste météo de Neuvy).

★ Préconisation

Dans l'Allier, soyez vigilant dès la sortie de la dernière feuille : La **Septoriose** nécessite une intervention en Sologne et Bocage en tenant compte de **PRESEPT** et des observations au champ (10 % des F3 touchées).
Utiliser une triazole haut de gamme (efficace aussi sur Rouille brune).
Consulter le dépliant SPV-ITCF.
Surveiller aussi Rouille jaune et Rouille brune.

Publication mensuelle
Abonnement annuel : 250 Fcs
Chèques : Règle de recette D. R. A. F.
Imprimerie D. R. A. F.

D.R.A.F. Service Régional
de la Protection des Végétaux
Marmilhat B.P. 45 - 63370 LEMPDES
Tel : 73. 42. 14. 83 - Fax : 73. 90. 83. 70

711

ORGE D'HIVER

Stade : Epiaison : 10-1.

MALADIES

★ Situation

Evolution modérée des maladies.

★ Préconisation

Un 2ème traitement peut se justifier en cas de "montée" des maladies sur les F3.

BETTERAVES

PUCERONS ET VIROSES

★ Situation


En bacs jaunes à LEMPDES (63), les captures des différents pucerons vecteurs de Jaunisse ont démarré dès le 18/4 et se poursuivent actuellement modérément.

★ Préconisation

Pour les parcelles non protégées au semis, l'application d'un aphicide foliaire peut se justifier dès maintenant. Pour les autres protégées au semis avec un microgranulé comme CURATER ou COUNTER : VIGILANCE (rémanence de 30 jours).

S.R.P.V. AUVERGNE - PRESEPT (Poste de St-Pourçain-/Besbre)

Contamination et indice de risque de la septoriose



Légende:

--- Contaminations — F. Basses F3-F4-F5 F. Hautes F1-F2

- Risque très faible. Attendre prochaine consultation +8 j
- Risque faible, surveiller prochaine pluie
- ▨ Risque agronomique moyen, traitement en fonction prévision météo
- Risque élevé, traitement toutes situations recommandé